

## Reacciones Alérgicas

### Reacciones a picaduras y mordeduras de insectos.

Personas que han experimentado reacciones severas localizadas o generalizadas por picadura de insectos, deben recibir tratamientos de desensibilización por un médico. El aguijón de un insecto puede poner en peligro la vida de una persona sensibilizada.

### Cosas que deben hacerse a un paciente sensibilizado:

- Aplique un vendaje constrictivo en la pierna o brazo del paciente por encima de la picadura.
- Use una pinza gruesa y ancha de tela y envuélvala alrededor y por encima de la picadura.
- Haga un nudo simple y coloque encima del nudo un pedazo de palo o rama, haga un nudo completo nuevamente por encima y luego dele vueltas para ajustar así el vendaje.
- Esté seguro de sentir el pulso por debajo del torniquete y además el paciente no debe sentir sensación de pulsación en el lugar del vendaje.
- Ponga una bolsa con hielo o trapos con agua fría sobre la picadura.
- Saque con una pinza los pedazos de lanceta del insecto en el sitio de la picadura.
- Consiga atención profesional apenas pueda.

### Reacciones generalizadas debido a Alergia Alimenticia

#### Síntomas:

- Dificultad en la respiración.
- Posiblemente ronchas o hinchazón de la piel.
- Llame al médico.
- Mantenga al paciente tranquilo y en posición comfortable.
- Provoque el vómito.

### Plantas Venenosas

#### Condiciones que demandan cuidado:

- Antecedentes de contacto con hiedra o plantas venenosas (ivy/poison), (sumac), (oak).
- Comezón, enrojecimiento o ampollas en la piel posteriores al contacto sospechoso.

- Corte la parte del vestido que ha estado en contacto con el veneno para que no siga contaminando otras áreas contaminadas.
- Repita el lavado varias veces.
- Use alcohol de frotación.
- Si se forman ampollas, llámé al médico.